

## MEDICAMENTOS MULTIDOSES

# CONSERVAÇÃO E VALIDADE APÓS ABERTURA DA EMBALAGEM

### Semissólidos em embalagem multidoso

- Caso o produto venha em tubo, espremer pequena quantidade na gaze para aplicar;
- Caso o produto venha em pote, utilizar uma espátula para retirar o produto;
- Após aplicar o medicamento na lesão, não voltar a encostar a gaze ou espátula na boca do tubo ou do pote para não o contaminar;
- A embalagem deve ser mantida limpa, com a retirada dos resíduos do produto na tampa ou rosca do pote;
- Nunca usar os dedos para retirar produtos no tubo ou pote;
- Após abertura, frascos e bisnagas deverão ser identificados com etiqueta contendo datas de abertura e de validade do medicamento, preservando a visualização do lote e nome do medicamento.

### Injetáveis em embalagem multidoso

- Inspeccionar o frasco visualmente, pois medicamentos injetáveis não podem apresentar corpos estranhos;
- Desinfecção da rolha de borracha com álcool 70%;
- Tanto para reconstituição com diluente apropriado de medicamentos injetáveis, quanto para retirada do medicamento, é recomendado não utilizar agulhas 40x12, pois pequenos fragmentos de rolha de borracha podem ser levados para dentro dos frascos durante o procedimento;
- Após abertura o frasco deverá ser identificado com etiqueta contendo datas de abertura e de validade do medicamento, preservando a visualização do lote e nome do medicamento.

### Soluções orais em embalagem multidoso

- Ao destampar o frasco, colocar a parte interna da tampa virada para cima e recolocar a tampa no frasco o mais rápido possível;
- Antes da administração, verificar se o conteúdo está homogêneo e sem grumos;
- Ao inclinar o frasco para retirar a quantidade desejada, o rótulo deve ficar virado para cima, pois assim, se o líquido escorrer, não manchará o rótulo;
- Manter o frasco multidoso em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio;
- Após abertura o frasco deverá ser identificado com etiqueta contendo datas de abertura e de validade do medicamento, preservando a visualização do lote e nome do medicamento.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



SOMOS  
COOP

## Soluções e creme oftalmológicos em embalagem multidose

- Ao destampar o frasco, colocar a parte interna da tampa virada para cima e recolocar a tampa no frasco o mais rápido possível;
- Evitar o contato do frasco com os dedos e/ou com as superfícies das pálpebras ou dos olhos;
- Manter o frasco multidose em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio;
- Após abertura, frascos e bisnagas deverão ser identificados com etiqueta contendo datas de abertura e de validade do medicamento, preservando a visualização do lote e nome do medicamento.

Tipo de medicamento	Validade após a abertura*
Cremes / pomadas industrializadas	30 dias.
Cremes / pomadas manipuladas	Validade estipulada pelo fabricante.
Colírios e pomadas oftálmicas	28 dias.
Sol. Oraís/ gotas industrializadas	25% do tempo restante entre a data de abertura e o prazo de validade, máximo de 6 meses.
Suspensões orais extemporâneas (pó)	25% do tempo restante entre a data de abertura e o prazo de validade, máximo de 6 meses.
Insulinas	28 dias, refrigerado.

Legenda: \*As recomendações podem ser alteradas de acordo com o fabricante.

## DÚVIDAS

### EXEMPLO 1:

Medicamento aberto em 06/2022, com validade até 06/2025: faltam 36 meses para vencer. Logo,  $36/4$  (25% do tempo) = 9 meses. Logo, consideraremos 6 meses, porque é o máximo de tempo que permitido após ruptura do lacre;

### EXEMPLO 2:

Medicamento aberto em 04/2022, com vencimento em 12/2023: faltam 20 meses para vencer:  $20/4$  (25% do tempo) = 5 meses. Logo, o prazo de validade será 09/2022.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

